

Ультразвуковая диагностика	Подготовка
УЗИ органов брюшной полости	<ul style="list-style-type: none"> - исследование проводится натощак – за 6ч до процедуры нельзя есть и пить;
Дуплексное сканирование брюшной аорты и ее висцеральных ветвей, нижней полой вены и системы порталных вен	<ul style="list-style-type: none"> - за 3 дня до предстоящего исследования рекомендована легкая диета: исключаются продукты, усиливающие перистальтику кишечника и газообразование (мучные изделия, черный хлеб, сырье овощи и фрукты, бобовые, молоко, соки, газированные и алкогольные напитки); при повышенном газообразовании пациенту рекомендуется в течение 3х дней принимать препараты-адсорбенты (активированный уголь); - за 3 дня до исследования не проводить рентгеновские исследования с барием; - за сутки до исследования не проводить гастроскопию, колоноскопию и клизмы.
Дуплексное сканирование артерий почек	
УЗИ почек и надпочечников	<ul style="list-style-type: none"> - за 3 дня до предстоящего исследования рекомендована легкая диета без применения продуктов, усиливающих перистальтику кишечника и газообразование (исключить мучные изделия, черный хлеб, сырье овощи и фрукты, бобовые, молоко, соки, газированные и алкогольные напитки).
УЗИ мочевого пузыря	<ul style="list-style-type: none"> - исследование проводится при наполненном мочевом пузыре (выпить 1л негазированной воды)
УЗИ предстательной железы (трансабдоминально)	<ul style="list-style-type: none"> - на исследование приходить с наполненным мочевым пузырем (выпить 1л негазированной воды)
ТРУЗИ (трансректальное исследование предстательной железы)	<ul style="list-style-type: none"> - за 3 дня до предстоящего исследования рекомендована легкая диета: исключаются сырье овощи и фрукты, бобовые, молоко, соки, газированные и алкогольные напитки; - за 2-3 дня необходимо исключить препараты, способствующие разжижению крови (аспирин, плавикс); - последний прием пищи желательно совершить за 12ч до процедуры; - за 3-4ч до исследования необходимо опорожнить кишечник (клизма/слабительное).
УЗИ органов малого таза	<ul style="list-style-type: none"> - для женщин репродуктивного возраста исследование желательно проводить на 5-7 день менструального цикла (при отсутствии специальных назначений гинеколога) - для женщин в менопаузе исследование можно проводить в любой день - при трансабдоминальном обследовании (перед исследованием наполнить мочевой пузырь – выпить 1л негазированной воды).
УЗИ молочных желез	<ul style="list-style-type: none"> - для женщин репродуктивного возраста исследование желательно проводить на 5-10 день менструального цикла; - для женщин в менопаузе исследование можно проводить в любой день.
Эхокардиографическое исследование сердца	<ul style="list-style-type: none"> - не позднее чем за 1,5-2ч до исследования – прием пищи без кофе, чая, энергетических напитков; - за 1,5-2ч до исследования пациенту рекомендуется не курить и не выполнять физических упражнений.